

年老和暈眩 (Aging and Dizziness)

Author: 作者: Bridgett Wallace, PT, DPT

翻譯: 林佳政 物理治療師 Translate by: Chia-Cheng Lin, PhD, PT, MSPT

Fact Sheet

年老對平衡和暈眩的影響?

暈眩和平衡的疾病是最常發生在老年人的問題。65歲後，暈眩的問題是看醫生和住院最常見的原因之一。有些患者會形容暈眩為一種在旋轉的感覺，有些則形容為覺得無法保持平衡，或像是在船上一樣或是頭昏眼花(lightheadedness)的感覺。無論是對暈眩的何種描述，暈眩會導致行走困難、噁心、焦慮、容易疲勞、無法專心、甚至於憂鬱。上面所提的症狀都會增加跌倒的危險，跌倒也是對老年人健康的重要考量。

要如何做才能治療暈眩和(或)失去平衡能力?

雖然隨著年紀的增加，身體也跟著改變，但是暈眩和喪失行動力並不是這過程中的一部份。有很多原因會引起暈眩和失去平衡能力，例如不良的姿勢或肌力、柔軟度和耐力的減弱。受傷、疾病(關節炎、糖尿病等)、內耳的問題、大腦疾病(如帕金森氏病和中風等)，藥物的使用也有可能引起暈眩和失去平衡能力。然而好消息是：大多的暈眩和平衡疾病是可以被治療的。在您生活的周遭就可能會有測驗是什引起您暈眩或失去平衡能力的診所。這些物理治療師們能替您安排適合您的治療計畫。如果您有平衡的問題或是暈眩，現在請盡早行動! 詢問您的醫生或當地的物理治療師，看看您該如何進行下一步。額外的資訊請詳見

www.neuropt.org和www.vestibular.org

Produced by



VESTIBULAR REHABILITATION
SPECIAL INTEREST GROUP

A Special Interest
Group of



ACADEMY OF
NEUROLOGIC
PHYSICAL THERAPY

Contact us:

ANPT

5841 Cedar Lake Rd S.

Ste 204

Minneapolis, MN 55416

Phone: 952.646.2038

Fax: 952.545.6073

info@neuropt.org

www.neuropt.org

a component of

